

PREPARAZIONE per COLONSCOPIA BASSO VOLUME se NON STIPSI (n. evacuazioni 3 o più a sett)

Acquistare in Farmacia) PLENVU oppure CLENSIA

DIETA: il giorno prima eliminare frutta, verdura, alimenti integrali, consentita colazione leggera con the e fette biscottate e pranzo con minestrina in brodo.

PREPARAZIONE

Preparazione della soluzione da bere: attenersi alle istruzioni nella scatola.

L'orario di inizio della preparazione varia in base all'orario di appuntamento: per ottenere un ottimale risultato dell'esame, attenersi scrupolosamente alle indicazioni:

APPUNTAMENTO ENTRO LE 11:00

il giorno prima	alle 20:00: assumere DOSE 1 (Plenvu 1/2lt o Clensia 1lt) + 1/2 lt di liquidi chiari
il giorno prima	alle ore 22 bere DOSE 2 (Plenvu 1/2lt o Clensia 1L) alternata a 1/2lt di liquidi chiari in 45 min

APPUNTAMENTO DALLE 11:00 alle 14 modalità frazionata

il giorno prima	alle 22:00: bere DOSE 1 (Plenvu 1/2lt o Clensia 1lt) + ½ lt di liquidi chiari
il giorno dell'esame	5h prima dell'appuntamento: bere DOSE 2 (Plenvu 1/2lt o Clensia 1L) alternata a 1/2lt di liquidi chiari in 45 min

APPUNTAMENTO DOPO LE 14 TUTTA IL GIORNO STESSO

il giorno dell'esame	7h prima dell'appuntamento: bere in 2 ore circa DOSE 1 (Plenvu 1/2lt o Clensia 1L) + ½ lt di liquidi chiari e a seguire DOSE 2 (Plenvu 1/2lt o Clensia 1L) +1/2 lt di liquidi chiari in 2 ore circa
----------------------	---

Non assumere liquidi nelle 4 ore precedenti l'esame

La terapia domiciliare deve essere assunta anche il giorno dell'esame con un sorso d'acqua.

Se esame in narcosi, portare in visione esami ematici (emocromo, azotemia, glicemia, creatinina e PT, PTT) ed ECG degli ultimi 6 mesi

E'NECESSARIO

- impegnativa di colonscopia ed infusione (cod 45.23 e 99.22)
- elenco della terapia domiciliare e documentazione relativa (soprattutto esami endoscopici pregressi)
- rimuovere lo smalto dalle unghie
- per i portatori di stomia, portare un cambio
- si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo

RACCOMANDAZIONI per la gestione della terapia antiaggreganti ed anticoagulanti, salvo diversa indicazione da cardiologo di riferimento

- Aspirina clopidogrel e ticlopidina: NON sospendere;
- Coumadin, Sintrom rivolgersi al medico curante. Raccomandata la sospensione e controllo INR recente
- Anticoagulanti Orali Diretti (DOAC): non assumere la compressa la mattina dell'esame

VENIRE ACCOMPAGNATI DA PERSONA CHE DEVE ESSERE PRESENTE AL MOMENTO DELL'ACCETTAZIONE, DEVE SVOLGERE LA PRATICA AMMINISTRATIVA ED ESSERE IN GRADO DI GUIDARE, POICHÉ DOPO LA SEDAZIONE È VIETATO FARLO NELLE SUCCESSIVE 12 H